

NOVAGEX

INNOVACIÓN QUE TRANSFORMA. RESULTADOS QUE ELEVAN

BPC-157

PÉPTIDO REGENERATIVO

BPC-157 (Body Protection Compound-157) es un péptido sintético derivado de una proteína gástrica humana que promueve la **reparación y regeneración de tejidos**, **acelerando la recuperación de lesiones en músculos**, tendones, ligamentos, nervios y mucosas.



REGENERACIÓN
DE TEJIDOS



RECUPERACIÓN
DE LESIONES



DISMINUYE
INFLAMACIÓN



¿QUÉ ES?

Péptido bioactivo derivado de una proteína gástrica humana que participa en procesos fisiológicos de reparación, regeneración y mantenimiento de la integridad tisular.



BENEFICIOS CLÍNICOS



Acelera la cicatrización y reparación de tejidos blandos y duros.



Disminuye la inflamación y el dolor asociado a lesiones.



Protege y regenera el cartílago, tendones, ligamentos y mucosas.



Favorece la angiogénesis (formación de nuevos vasos sanguíneos).



PRESENTACIÓN

Frasco ampula con 10 mg de BPC-157 liofilizado.



DILUYENTE RECOMENDADO

Agua bacteriostática estéril. No utilizar solución salina para su reconstitución.



CONSERVACIÓN

Conservar en refrigeración (2 – 8 °C). No congelar una vez diluido.

PROTOCOLO PROFESIONAL

GUÍA DE PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN

DILUCIÓN RECOMENDADA



Añadir 2 ml de agua bacteriostática estéril al frasco con 10 mg.

Concentración final: 5 mg/ml.



No utilizar solución salina para su reconstitución.

CONVERSIONES (Concentración 5 mg/ml)

VOLUMEN	mg	UNIDADES (U-100)
0.02 ml	0.1 mg	2 U
0.04 ml	0.2 mg	4 U
0.06 ml	0.3 mg	6 U
0.08 ml	0.4 mg	8 U
0.10 ml	0.5 mg	10 U

* Utilizar jeringa de insulina U-100 para una dosificación precisa.

DURACIÓN TRAS RECONSTITUCIÓN

- Conservar en refrigeración (2 - 8 °C).
- Vida útil: hasta 30 días después de reconstituido con agua bacteriostática, en condiciones óptimas de almacenamiento y manipulación.

DOSIFICACIÓN



Dosis recomendada: 0.2 - 0.5 mg (4 - 10 U) por aplicación.



La dosis puede ajustarse según el tipo de lesión, gravedad y respuesta individual.




Vía de administración: subcutánea (SC), rotando los sitios de inyección.



Se recomienda aplicación diaria, ajustando la dosis de acuerdo con el objetivo clínico y la tolerabilidad.

Evaluar periódicamente.

EQUIVALENCIAS RÁPIDAS



10 U = 0.1 ml = 0.5 mg de BPC-157
(Concentración 5 mg/ml)

PROTOCOLO SUGERIDO



LESIONES AGUDAS
0.2 - 0.3 mg (4 - 6 U) diarios

2 - 4
semanas



LESIONES CRÓNICAS
0.2 - 0.5 mg (4 - 10 U) diarios

4 - 8 semanas
o más, según evolución



REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO
0.1 - 0.2 mg (2 - 4 U) diarios

3 - 5 días por semana, según evolución



Los protocolos pueden ajustarse según el objetivo clínico y la valoración del especialista.



USO PROFESIONAL
Producto de uso exclusivo por profesionales de la salud.

