

DSIP

PÉPTIDO NEUROMODULADOR

DSIP (Delta Sleep-Inducing Peptide) es un péptido endógeno con propiedades neuromoduladoras que regula funciones fisiológicas clave como el **sueño profundo, la respuesta al estrés, la modulación del dolor** y la actividad del sistema inmune.



SUEÑO
PROFUNDO



RESPUESTA AL
ESTRÉS



MODULACIÓN
DEL DOLOR



¿QUÉ ES?

Péptido endógeno neuromodulador que favorece el sueño profundo y regula la respuesta al estrés, la percepción del dolor y el equilibrio fisiológico.



BENEFICIOS CLÍNICOS



Induce y mejora el sueño profundo sin causar dependencia.



Modula la respuesta al estrés y la ansiedad, promoviendo equilibrio neuroendocrino.



Posee efecto analgésico y neuroprotector.



Regula la función inmune y favorece la homeostasis.



PRESENTACIÓN

Frasco ampula con 12 mg de DSIP liofilizado.



DILUYENTE RECOMENDADO

Agua bacteriostática estéril. No utilizar solución salina para su reconstitución.



CONSERVACIÓN

Conservar en refrigeración (2 – 8 °C). No congelar una vez diluido.

PROTOCOLO PROFESIONAL

GUÍA DE PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN

DILUCIÓN RECOMENDADA



Añadir 2 ml de agua bacteriostática estéril al frasco con 12 mg.

Concentración final: 6 mg/ml.



No utilizar solución salina para su reconstitución.

CONVERSIONES (Concentración 6 mg/ml)

VOLUMEN	mg	UNIDADES (U-100)
0.02 ml	0.12 mg	2 U
0.04 ml	0.24 mg	4 U
0.06 ml	0.36 mg	6 U
0.08 ml	0.48 mg	8 U
0.10 ml	0.6 mg	10 U

* Utilizar jeringa de insulina U-100 para una dosificación precisa.

DURACIÓN TRAS RECONSTITUCIÓN

- Conservar en refrigeración (2 - 8 °C).
- Vida útil: hasta 28 días después de reconstituido con agua bacteriostática, en condiciones óptimas de almacenamiento y manipulación.

DOSIFICACIÓN



Dosis recomendada: 0.12 - 0.36 mg (2 - 6 U) por aplicación.



La dosis puede ajustarse según el objetivo clínico y la valoración del especialista.



Vía de administración: subcutánea (SC), rotando el sitio de aplicación.




Administrar preferentemente por la noche, antes de dormir.



La duración del tratamiento depende del objetivo clínico y la respuesta del paciente. Evaluar periódicamente.

EQUIVALENCIAS RÁPIDAS



10 U = 0.1 ml = 0.6 mg de DSIP
(Concentración 6 mg/ml)

PROTOCOLO SUGERIDO



ESTRÉS / ANSIEDAD / INSOMNIO
0.12 - 0.24 mg (2 - 4 U)
antes de dormir

2 - 4
semanas



DOLOR /
NEUROPROTECCIÓN
0.24 - 0.36 mg
(4 - 6 U) diarios

4 - 8 semanas
o según evolución
clínica



Los protocolos pueden ajustarse según el objetivo clínico y la valoración del especialista.



USO PROFESIONAL
Producto de uso exclusivo
por profesionales de la salud.

