

NOVAGEX

INNOVACIÓN QUE TRANSFORMA. RESULTADOS QUE ELEVAN

EPITHALON

PÉPTIDO REGULADOR CELULAR

Epitalon (Epithalon) es un péptido sintético que actúa regulando la actividad de la **telomerasa**, favoreciendo la salud celular, el equilibrio hormonal y el bienestar general.



SALUD
CELULAR



EQUILIBRIO
HORMONAL



BIENESTAR
GENERAL



¿QUÉ ES?

Péptido sintético que participa en procesos relacionados con la regulación celular, el equilibrio fisiológico y el mantenimiento de la función biológica.



BENEFICIOS CLÍNICOS



Activa la telomerasa y ayuda a proteger y mantener la longitud de los telómeros.



Promueve la longevidad celular y el envejecimiento saludable.



Mejora el sueño, la recuperación física y mental, y la función inmunológica.



PRESENTACIÓN

Frasco ampula con 50 mg de Epitalon liofilizado.



DILUYENTE RECOMENDADO

Agua bacteriostática estéril. No utilizar solución salina para su reconstitución.



CONSERVACIÓN

Conservar en refrigeración (2 – 8 °C). No congelar una vez diluido.

PROTOCOLO PROFESIONAL

GUÍA DE PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN

DILUCIÓN RECOMENDADA



Añadir 2 ml de agua bacteriostática estéril al frasco con 50 mg.

Concentración final: 25 mg/ml.



No utilizar solución salina para su reconstitución.

CONVERSIONES (Concentración 25 mg/ml)

VOLUMEN	mg	UNIDADES (U-100)
0.1 ml	2.5 mg	10 U
0.2 ml	5 mg	20 U
0.3 ml	7.5 mg	30 U
0.4 ml	10 mg	40 U
0.5 ml	12.5 mg	50 U
1.0 ml	25 mg	100 U

* Utilizar jeringa de insulina U-100 para una dosificación precisa.

DURACIÓN TRAS RECONSTITUCIÓN

- Conservar en refrigeración (2 - 8 °C).
- Vida útil: hasta 30 días después de reconstituido con agua bacteriostática, en condiciones óptimas de almacenamiento y manipulación.

DOSIFICACIÓN



Dosis sugerida: 5 - 10 mg (20 - 40 U) una vez al día.



La dosis debe individualizarse según el objetivo clínico, la tolerabilidad y la valoración del especialista.



Vía de administración: subcutánea (SC), preferentemente por la noche.




Administrar una vez al día, preferentemente por la noche.



Duración sugerida: 10 - 20 días, con seguimiento y valoración periódica.

EQUIVALENCIAS RÁPIDAS



10 U = 0.1 ml = 2.5 mg de EPITHALON
(Concentración 25 mg/ml)

PROTOCOLO SUGERIDO



ESQUEMA BÁSICO
5 mg (20 U) diario

10 - 20 días



ESQUEMA AJUSTADO
10 mg (40 U) diarios

10 - 20 días, según objetivo clínico y tolerabilidad. Valorar antes de repetir el ciclo



Los protocolos pueden ajustarse según el objetivo clínico y la valoración del especialista.



USO PROFESIONAL
Producto de uso exclusivo por profesionales de la salud.

