

GHK-Cu

PÉPTIDO BIOACTIVO DE COBRE

GHK-Cu (Glicil-L-Histidil-L-Lisina Cobre) es un **tripéptido natural unido a cobre**, presente de forma endógena en el plasma humano. Posee potentes propiedades regenerativas, antioxidantes, antiinflamatorias y estimulantes de colágeno y elastina.



SALUD
CAPILAR



REPARACIÓN
DE TEJIDOS



ESTIMULA COLÁGENO
Y ELASTINA




ACCIÓN
ANTIOXIDANTE



¿QUÉ ES?

Péptido bioactivo de cobre que actúa a nivel celular estimulando procesos de regeneración, protección antioxidante y reparación tisular.



ACTIVO PRINCIPAL



GHK-Cu

(Glicil-L-Histidil-L-Lisina Cobre)
Tripéptido bioactivo de cobre.

BENEFICIOS CLÍNICOS



Estimula la producción de
colágeno y elastina.



Potente **acción**
antioxidante.



Favorece la reparación y
cicatrización de tejidos.



Favorece el crecimiento
capilar y fortalece los
fóliculos.



Mejora la firmeza,
elasticidad e hidratación.



Disminuye la inflamación
y el daño oxidativo.



PRESENTACIÓN

Frasco ampula con 100
mg de GHK-Cu
liofilizado.



DILUYENTE RECOMENDADO

Agua bacteriostática estéril.
No utilizar solución salina para
su reconstitución.



CONSERVACIÓN

Conservar en refrigeración (2 – 8 °C.).
No congelar una vez diluido.

PROTOCOLO PROFESIONAL

GUÍA DE PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN

DILUCIÓN RECOMENDADA



Añadir 2 ml de agua bacteriostática estéril al frasco con 100 mg.

Concentración final: 50 mg/ml



No utilizar solución salina para su reconstitución.

CONVERSIONES (Concentración 50 mg/ml)

VOLUMEN	mg	UNIDADES (U-100)
0.02 ml	1 mg	2 U
0.04 ml	2 mg	4 U
0.06 ml	3 mg	6 U
0.08 ml	4 mg	8 U
0.10 ml	5 mg	10 U
0.20 ml	10 mg	20 U

* Utilizar jeringa de insulina U-100 para una dosificación precisa.

DURACIÓN TRAS RECONSTITUCIÓN

- Conservar en refrigeración (2 - 8 °C).
- Estable hasta 30 días después de reconstituido, en condiciones óptimas de almacenamiento y manipulación.

DOSIFICACIÓN



Dosis recomendada: 1 - 5 mg (2 - 10 U) por sesión, con escalamiento semanal.



Vía de administración: Intradérmica (ID), subcutánea (SC) o intramuscular (IM).



La dosis puede ajustarse según el objetivo clínico y la valoración del especialista.




Frecuencia sugerida: 2 - 3 veces por semana; puede variar de acuerdo con la valoración y el objetivo clínico.



La duración del tratamiento depende del objetivo clínico y la respuesta del paciente. Evaluar periódicamente.

EQUIVALENCIAS RÁPIDAS



10 U = 0.1 ml = 5 mg de GHK-Cu
(Concentración 50 mg/ml)

ESQUEMAS SUGERIDOS DE TRATAMIENTO



REJUVENECIMIENTO FACIAL
1 - 3 mg (2 - 6 U) por sesión

Aplicación diaria, cada tercer día o 5 veces por semana, según el protocolo personalizado.



CAÍDA CAPILAR
3 - 5 mg (6 - 10 U) por sesión.

6 - 10 sesiones



CICATRICES Y REPARACIÓN
1 - 2 mg (2 - 4 U) por sesión

2 - 3 veces por semana o semanal, según evolución.



Los protocolos pueden ajustarse según el objetivo clínico y la valoración del especialista.



USO PROFESIONAL
Producto de uso exclusivo por profesionales de la salud.

