

IGF-1LR3

PÉPTIDO ANABÓLICO REGENERATIVO

IGF-1LR3 (Insulin-like Growth Factor 1) Long R3) **es una variante recombinante del factor de crecimiento** similar a la insulina tipo 1, con una extensión en la cadena de arginina (R3) que prolonga su vida media y potencia sus efectos anabólicos y regenerativos en los tejidos.



REGENERACIÓN
CELULAR



CRECIMIENTO
MUSCULAR




RECUPERACIÓN
DE TEJIDOS



¿QUÉ ES?

Factor de crecimiento recombinante de acción prolongada que participa en procesos fisiológicos de crecimiento, regeneración tisular y actividad anabólica celular.



BENEFICIOS CLÍNICOS



Estimula el crecimiento, reparación y regeneración celular.



Promueve el desarrollo y mantenimiento de masa muscular magra.



Mejora la síntesis de colágeno y la salud de la piel, huesos y tejidos conectivos.



Acelera la recuperación de lesiones y reduce el tiempo de rehabilitación.



Aumenta la energía, vitalidad y bienestar general.



PRESENTACIÓN

Frasco ampula con 10 mg de IGF-1 Lr3 liofilizado.



DILUYENTE RECOMENDADO

Agua bacteriostática estéril. No utilizar solución salina para su reconstitución.



CONSERVACIÓN

Conservar en refrigeración (2 – 8 °C.). No congelar una vez diluido.

PROTOCOLO PROFESIONAL

GUÍA DE PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN

DILUCIÓN RECOMENDADA



Añadir 2 ml de agua bacteriostática estéril al frasco con 1 mg.

Concentración final: 500 mcg/ml



No utilizar solución salina para su reconstitución.

CONVERSIONES (Concentración 500 mcg/ml)

VOLUMEN	mc	UNIDADES (U-100)
0.04 ml	20 mcg	4 U
0.06 ml	30 mcg	6 U
0.08 ml	40 mcg	8 U
0.10 ml	50 mcg	10 U
0.15 ml	75 mcg	15 U
0.20 ml	100 mcg	20 U

* Utilizar jeringa de insulina U-100 para una dosificación precisa.

DURACIÓN TRAS RECONSTITUCIÓN

- Conservar en refrigeración (2 - 8 °C).
- Vida útil: 21-30 días después de reconstituido con agua bacteriostática, en condiciones óptimas de almacenamiento y manipulación.

DOSIFICACIÓN



Dosis recomendada: 20 - 100 mcg (0.04 - 0.2 ml) por aplicación.



Vía de administración más utilizada: subcutánea (SC), rotando los sitios de aplicación.



La dosis puede ajustarse según el objetivo clínico, la edad y la respuesta individual.




Administrar 1 vez al día, preferentemente por la mañana.



La duración del tratamiento depende del objetivo clínico y la respuesta del paciente. Evaluar periódicamente.

EQUIVALENCIAS RÁPIDAS



10 U = 0.1 ml = 50 mcg de IGF-1 LR3
(Concentración 500 mcg/ml)

ESQUEMAS SUGERIDOS DE TRATAMIENTO



RECOMPOSICIÓN CORPORAL Y DESARROLLO MUSCULAR
20 - 50 mcg diarios

8 - 12
semanas



REJUVENECIMIENTO Y RECUPERACIÓN
20 - 50 mcg diarios

4 - 8 semanas
o según evolución



Los protocolos pueden ajustarse según el objetivo clínico y la valoración del especialista.



USO PROFESIONAL
Producto de uso exclusivo por profesionales de la salud.

