

NOVAGEX

INNOVACIÓN QUE TRANSFORMA. RESULTADOS QUE ELEVAN

PT-141

PÉPTIDO AFRODISÍACO Y MODULADOR SEXUAL

PT-141 (Bremelanotide) es un péptido sintético que actúa sobre el sistema nervioso central, estimulando la libido y el deseo sexual tanto en hombres como en mujeres. Ayuda a **mejorar la función sexual, aumentar la excitación** y promover una respuesta sexual más natural.



MEJORA FUNCIÓN
SEXUAL



AUMENTA LA
EXCITACIÓN



MEJORA RESPUESTA
SEXUAL



¿QUÉ ES?

Péptido neuroactivo que actúa sobre receptores del sistema nervioso central, participando en la regulación fisiológica del deseo y la respuesta sexual.



BENEFICIOS CLÍNICOS



Activa los receptores de melanocortina en el cerebro, aumentando el deseo sexual.



Incrementa la excitación y la respuesta sexual natural.



Mejora la función sexual en hombres y mujeres.



Efecto rápido y buena tolerabilidad cuando se utiliza según las indicaciones.



PRESENTACIÓN

Frasco ampula con 10 mg de PT-141 liofilizado.



DILUYENTE RECOMENDADO

Agua bacteriostática estéril. No utilizar solución salina para su reconstitución.



CONSERVACIÓN

Conservar en refrigeración (2 – 8 °C). No congelar una vez diluido.

PROTOCOLO PROFESIONAL

GUÍA DE PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN

DILUCIÓN RECOMENDADA



Añadir 2 ml de agua bacteriostática estéril al frasco con 10 mg.

Concentración final: 5 mg/ml.



No utilizar solución salina para su reconstitución.

CONVERSIONES (Concentración 5 mg/ml)

VOLUMEN	mg	UNIDADES (U-100)
0.05 ml	0.25 mg	5 U
0.10 ml	0.5 mg	10 U
0.20 ml	1 mg	20 U
0.25 ml	1.25 mg	25 U
0.30 ml	1.5 mg	30 U
0.35 ml	1.75 mg	35 U

* Utilizar jeringa de insulina U-100 para una dosificación precisa.

DURACIÓN TRAS RECONSTITUCIÓN

- Conservar en refrigeración (2 - 8 °C).
- Vida útil: hasta 30 días después de reconstituido con agua bacteriostática, en condiciones óptimas de almacenamiento y manipulación.

DOSIFICACIÓN



Dosis recomendada: 0.5 - 1.75 mg (10 - 35 U), según respuesta individual.



La dosis puede ajustarse según el objetivo clínico y la valoración del especialista.



Vía de administración: subcutánea (SC).




Administrar 45 - 60 minutos antes de la actividad sexual.



No usar más de una vez en un periodo de 24 horas.

EQUIVALENCIAS RÁPIDAS



5 U = 0.05 ml = 0.25 mg de PT-141
(Concentración 5 mg/ml)

PROTOCOLO SUGERIDO



HOMBRES

0.5 - 1.75 mg (10 - 35 U), según necesidad.

Usar 45 - 60 min antes de la actividad sexual



MUJERES

0.5 - 1.75 mg (10 - 35 U), según respuesta.

Usar 45 - 60 min antes de la actividad sexual



Los protocolos pueden ajustarse según el objetivo clínico y la valoración del especialista.



USO PROFESIONAL

Producto de uso exclusivo por profesionales de la salud.

