

NOVAGEX

INNOVACIÓN QUE TRANSFORMA. RESULTADOS QUE ELEVAN

SELANK

PÉPTIDO **NEUROREGULADOR Y ANSIOLÍTICO**

Selank es un péptido sintético derivado de la tuftsín, con **propiedades ansiolíticas, nootrópicas y neuroprotectoras**. Favorece la modulación emocional, mejora el enfoque y la memoria, y apoya el equilibrio del sistema nervioso.



REDUCE
ANSIEDAD



MEJORA
ENFOQUE



MEMORIA Y CLARIDAD
MENTAL



NEUROPROTECTOR



¿QUÉ ES?

Péptido neuroregulador que participa en la modulación de la actividad del sistema nervioso, favoreciendo el equilibrio emocional y el rendimiento cognitivo.



BENEFICIOS CLÍNICOS



Tiene efecto ansiolítico y reduce el estrés sin causar somnolencia.



Mejora la memoria, la concentración y la función cognitiva.



Posee efecto neuroprotector y modulador del sistema nervioso.



Favorece el equilibrio emocional y el bienestar general.



PRESENTACIÓN

Frasco ampula con 10 mg de Selank liofilizado.



DILUYENTE RECOMENDADO

Agua bacteriostática estéril. No utilizar solución salina para su reconstitución.



CONSERVACIÓN

Conservar en refrigeración (2 – 8 °C.). No congelar una vez diluido.

PROTOCOLO PROFESIONAL

GUÍA DE PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN

DILUCIÓN RECOMENDADA



Añadir 2 ml de agua bacteriostática estéril al frasco con 11 mg.

Concentración final: 5.5 mg/ml



No utilizar solución salina para su reconstitución.

CONVERSIONES (Concentración 5.5 mg/ml)

VOLUMEN	mg	UNIDADES (U-100)
0.02 ml	0.11 mg	2 U
0.04 ml	0.22 mg	4 U
0.06 ml	0.33 mg	6 U
0.08 ml	0.44 mg	8 U
0.10 ml	0.55 mg	10 U
0.20 ml	1.1 mg	20 U

* Utilizar jeringa de insulina U-100 para una dosificación precisa.

DURACIÓN TRAS RECONSTITUCIÓN

- Conservar en refrigeración (2 - 8 °C).
- Estable hasta 14 días después de reconstituido.

DOSIFICACIÓN



Dosis recomendada: 0.11 - 0.33 mg (2-6 U) por

aplicación.



Vía de administración: la intranasal es la más utilizada en estudios por favorecer una absorción eficiente.



La dosis puede ajustarse según el objetivo clínico y la valoración del especialista.




Administrar preferentemente por la noche, antes de dormir.



La duración del tratamiento depende del objetivo clínico y la respuesta del paciente. Evaluar periódicamente.

EQUIVALENCIAS RÁPIDAS



10 U = 0.1 ml = 0.55 mg de Selank
(Concentración 5.5 mg/ml)

ESQUEMAS SUGERIDOS DE TRATAMIENTO



ANSIEDAD / ESTRÉS

0.11 - 0.22 mg
(2 - 4 U) diarios

10-20
días continuos



MEJORA COGNITIVA

0.22 - 0.33 mg
(4 - 6 U) diarios

20-30 días, con
ciclos de
10 - 15 días
de descanso



Los protocolos pueden ajustarse según el objetivo clínico y la valoración del especialista.



USO PROFESIONAL

Producto de uso exclusivo por profesionales de la salud.

