

NOVAGEX

INNOVACIÓN QUE TRANSFORMA. RESULTADOS QUE ELEVAN

SEMAX

PÉPTIDO NOOTRÓPICO

Semax es un péptido sintético derivado de la secuencia ACTH (4-10) que actúa como neuroprotector y modulador de neurotransmisores. Mejora la **función cognitiva, la memoria, la atención y el estado de ánimo**, además de poseer propiedades ansiolíticas y adaptógenas.



FUNCIÓN
COGNITIVA



LA MEMORIA



MEJORA ESTADO
DE ÁNIMO



¿QUÉ ES?

Péptido neuroregulador que participa en la modulación de neurotransmisores, favoreciendo la función cognitiva, la neuroprotección y el equilibrio del sistema nervioso.



BENEFICIOS CLÍNICOS



Mejora la función cognitiva, memoria, aprendizaje y concentración.



Neuroprotector: protege las neuronas del estrés y daño oxidativo.



Regula el estado de ánimo, reduce la ansiedad y el estrés.



Aumenta la resistencia mental y física y la capacidad de adaptación.



Aumenta la resistencia mental y física y la capacidad de adaptación.



PRESENTACIÓN

Frasco ampula con 10 mg de Semax liofilizado.



DILUYENTE RECOMENDADO

Agua bacteriostática estéril. No utilizar solución salina para su reconstitución.



CONSERVACIÓN

Conservar en refrigeración (2 – 8 °C.). No congelar una vez diluido.

PROTOCOLO PROFESIONAL

GUÍA DE PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN

DILUCIÓN RECOMENDADA



Añadir 2 ml de agua bacteriostática estéril al frasco con 11 mg.

Concentración final: 5.5 mg/ml



No utilizar solución salina para su reconstitución.

CONVERSIONES (Concentración 5.5 mg/ml)

VOLUMEN	mc	UNIDADES (U-100)
0.02 ml	110 mcg	2 U
0.04 ml	220 mcg	4 U
0.06 ml	330 mcg	6 U
0.08 ml	440 mcg	8 U
0.10 ml	550 mcg	10 U
0.20 ml	1100 mcg	20 U

* Utilizar jeringa de insulina U-100 para una dosificación precisa.

DURACIÓN TRAS RECONSTITUCIÓN

- Conservar en refrigeración (2 - 8 °C).
- Estable hasta 14 días después de reconstituido.

DOSIFICACIÓN



Dosis recomendada: 200 - 600 mcg (0.2 - 0.6 mg) por día.



La dosis puede ajustarse según el objetivo clínico y la valoración del especialista.



Vía de administración: Intranasal (IN) o subcutánea (SC).




Administrar 1 - 2 veces al día, preferentemente por la mañana.



La duración del tratamiento depende del objetivo clínico y la respuesta del paciente.

EQUIVALENCIAS RÁPIDAS



10 U = 0.1 ml = 550 mcg de Semax
(Concentración 5.5 mg/ml)

PROTOCOLO SUGERIDO



ESQUEMA BÁSICO
200 - 400 mcg diarios

4 - 8
semanas



ESQUEMA AVANZADO
400 - 600 mcg diarios

8 - 12 semanas
o según evaluación clínica



Los protocolos pueden ajustarse según el objetivo clínico y la valoración del especialista.



USO PROFESIONAL
Producto de uso exclusivo por profesionales de la salud.

